

## BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

**Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.**

- Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

### Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is **Clarithromycine Abbott** en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u **Clarithromycine Abbott** inneemt
3. Hoe wordt **Clarithromycine Abbott** ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u **Clarithromycine Abbott**?
6. Aanvullende informatie

### NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

**Clarithromycine Abbott Uno** 500 mg tabletten met gereguleerde afgifte

**Clarithromycine Abbott Forte** 500 mg omhulde tabletten

**Clarithromycine Abbott** 250 mg omhulde tabletten

**Clarithromycine Abbott** 125 mg/5 ml granulaat voor orale suspensie

**Clarithromycine Abbott I.V.** 500 mg poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie

### KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

- De werkzame stof is clarithromycine.

Eén tablet met gereguleerde afgifte Clarithromycine Abbott Uno 500 mg bevat 500 mg clarithromycine,

één omhulde tablet Clarithromycine Abbott Forte 500 mg bevat 500 mg clarithromycine,

één omhulde tablet Clarithromycine Abbott 250 mg bevat 250 mg clarithromycine,

5 ml (na wedsamenstelling) Clarithromycine Abbott 125 mg/5 ml granulaat voor orale suspensie bevatten 125 mg clarithromycine,

één glazen flesje Clarithromycine Abbott I.V. 500 mg poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie bevat 500 mg clarithromycine.

- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:

**Clarithromycine Abbott Uno** 500 mg tabletten met gereguleerde afgifte

Kern van de tablet: citroenzuur – natriumalgiinaat – natriumcalciumalgiinaat – lactose – povidone – talk – stearinezuur – magnesiumstearaat

Omhulling: hypromellose – polyethyleenglycol – titaniumdioxide(E171) – sorbinezuur – Quinoleine (E104) Aluminium Lak.

**Clarithromycine Abbott Forte** 500 mg omhulde tabletten

Kern van de tablet: natrium croscarmellose type A – microcristallijn cellulose – siliciumdioxide – povidone – stearinezuur – magnesiumstearaat – talk

Omhulling: hypromellose – propyleenglycol – sorbitaan monooleaat – hydroxypropylcellulose – titaniumdioxide - vanilline – sorbinezuur – Quinoleine(E104) Aluminium Lak.

**Clarithromycine Abbott 250 mg omhulde tabletten**

Kern van de tablet: natrium croscarmellose – gepregelatiniseerd zetmeel – microcristallijn cellulose – siliciumdioxide – povidone – stearinezuur – magnesiumstearaat – talk – Quinoleine(E104) Aluminium Lak.

Omhuiling: hypromellose – propyleenglycol – sorbitaan monooleaat – hydroxypropylcellulose – titaniumdioxide – vanilline – sorbinezuur – Quinoleine(E104) Aluminium Lak.

**Clarithromycine Abbott 125 mg/5 ml granulaat voor orale suspensie**

Saccharose – hydroxypropylmethyl cellulose ftalaat – carbopol 974 – kaliumsorbaat – ricinusolie – povidone – fruit punch aroma – siliciumdioxide – xanthaangom – citroenzuur – titaniumdioxide – maltodextrine – gezuiverd water(ex tempore) voor 5 ml.

**Clarithromycine Abbott I.V. 500 mg poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie**

Lactobionzuur - natriumhydroxide

**Registratiehouder:**

Abbott S.A./N.V.  
Avenue Einstein 14  
1300 Wavre

**Fabrikant:**

**Clarithromycine Abbott Uno** 500 mg tabletten met gereguleerde afgifte

**Clarithromycine Abbott Forte** 500 mg omhulde tabletten

**Clarithromycine Abbott** 250 mg omhulde tabletten

**Clarithromycine Abbott** 125 mg/5 ml granulaat voor orale suspensie

ABBOTT S.r.l. – Via Pontina Km 52, 04010 Campoverde di Aprilia (Latina) ITALIE  
of

Aesica Queenborough Ltd.-Queenborough, Kent, ME11 EL-UK

**Clarithromycine Abbott I.V.** 500 mg poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie

FAMAR L’Aigle

L’usine de l’isle

28380 Saint-Rémy-sur-Avre

FRANCE

**Registratienummer:**

**Clarithromycine Abbott Uno** 500 mg tabletten met gereguleerde afgifte:BE187153

**Clarithromycine Abbott Forte** 500 mg omhulde tabletten: BE198405

**Clarithromycine Abbott** 250 mg omhulde tabletten: BE198396

**Clarithromycine Abbott** 125 mg/5 ml granulaat voor orale suspensie: BE198387

**Clarithromycine Abbott I.V.** 500 mg poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie:  
BE198414

## **1. Wat is Clarithromycine Abbott en waarvoor wordt het gebruikt?**

### **De farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte**

**Clarithromycine Abbott Uno** 500 mg wordt aangeboden in de vorm van tabletten met gereguleerde afgifte die met een weinig water ingenomen moeten worden, in dozen met

5, 10 of 20 tabletten (voor de laatsten verpakt per 2 tabletten per alveole: samen in te nemen), in een PVC/PVDC doordrukstrip.

**Clarithromycine Abbott Forte** 500 mg wordt aangeboden in de vorm van omhulde tabletten die met een weinig water ingenomen moeten worden, in een doos met 10 tabletten, in een PVC/PVDC doordrukstrip.

**Clarithromycine Abbott** 250 mg wordt aangeboden in de vorm van omhulde tabletten die met een weinig water ingenomen moeten worden, in dozen met 10 of 100 (unit-dosis) tabletten, in een PVC/PVDC doordrukstrip.

**Clarithromycine Abbott** 125 mg/5 ml wordt aangeboden in de vorm van een granulaat voor orale suspensie (na wedsamenstelling), in een fles van 60 ml of van 120 ml.

**Clarithromycine Abbott I.V.** 500 mg wordt aangeboden in de vorm van poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie, in een flesje dat 500 mg clarithromycine bevat, bestemd voor perfusie na voorafgaandelijke verdunning.

### **Farmacotherapeutische groep**

Clarithromycine Abbott behoort tot de farmacotherapeutische groep van macroliden die antibiotica zijn.

### **Therapeutische indicaties**

Bij volwassenen

De behandeling van infecties te wijten aan kiemen die gevoelig zijn voor clarithromycine, en meer bepaald bij:

- de behandeling van infecties van de onderste luchtwegen : bronchitis - longontsteking.
- de behandeling van infecties van de bovenste luchtwegen: angina - sinusitis.
- de behandeling van infecties van de huid en de weke weefsels.

Bij kinderen

Behandeling van infecties te wijten aan micro-organismen die gevoelig zijn voor clarithromycine en meer bepaald voor :

- de behandeling van keelontsteking te wijten aan streptokokken.
- de behandeling van acute middenoorontsteking.
- de behandeling van infecties van de huid en de weke weefsels.

**Clarithromycine Abbott I.V.** 500 mg poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie is uitsluitend aangewezen voor behandeling van ernstige infecties door kiemen waarvan men weet dat ze gevoelig zijn voor clarithromycine, en dit voor zover orale toediening onmogelijk is.

Van zodra het mogelijk is moet de IV behandeling door een orale behandeling worden vervangen.

## **2. Wat u moet weten voordat u Clarithromycine Abbott inneemt**

### **Neem Clarithromycine Abbott niet in...**

- als u een bekende overgevoeligheid bezit voor macroliden of voor een van de andere bestanddelen van het product.
- als u moederkoornalkaloïden inneemt
- voor Clarithromycine Abbott Uno 500 mg: als u een nierinsufficiëntie heeft
- als u met cisapride, pimozone of terfenadine wordt behandeld
- als het kaliumgehalte in uw bloed verminderd is.

### **Pas goed op...**

- als uw lever of nieren niet normaal werken: er moeten laboratoriumcontroles worden verricht. In deze gevallen moet clarithromycine met de nodige omzichtigheid worden toegediend. In de regel zijn macroliden tegenaangewezen in geval van ernstige leverinsufficiëntie.
- elk Clarithromycine Abbott Uno 500 mg tablet bevat 115 mg lactose. Dat is een hoeveelheid waarvan aangenomen wordt dat ze niet groot genoeg is om intolerantieverschijnselen uit te lokken.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek "Gebruik van Clarithromycine Abbott in combinatie met andere geneesmiddelen." te lezen

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

### **Gebruik van Clarithromycine Abbott in combinatie met voedsel en drank**

De tabletten met een weinig water innemen. Van Clarithromycine Abbott 250 mg en Clarithromycine Abbott Forte 500 mg wordt er gewoonlijk één tablet 's morgens en één tablet 's avonds, tijdens de maaltijden, ingenomen. In het geval van Clarithromycine Abbott Uno 500 mg wordt (worden) het tablet (de tabletten) in één keer ingenomen, liefst tijdens de maaltijden en altijd op hetzelfde ogenblik van de dag. De Clarithromycine Abbott Uno 500 mg tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt.

### **Zwangerschap**

Men weet nog niet of clarithromycine veilig is voor zwangere vrouwen. Bijgevolg mag clarithromycine aan zwangere vrouwen alleen worden voorgeschreven als men de voordelen tegen de risico's heeft afgewogen, in het bijzonder in de eerste drie zwangerschapsmaanden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

### **Borstvoeding**

Men weet nog niet of clarithromycine veilig is voor vrouwen die borstvoeding geven. Clarithromycine komt in de moedermelk terecht.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er bestaan geen gegevens over de invloed van dit geneesmiddel op deze activiteiten. Wel dient rekening gehouden met het mogelijk optreden van duizeligheid.

## **Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Clarithromycine Abbott**

Clarithromycine Abbott Uno 500 mg bevat lactose. Als u bepaalde suikers niet verdraagt raadpleeg dan uw arts alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

## **Gebruik van Clarithromycine Abbott in combinatie met andere geneesmiddelen**

Macroliden mogen niet worden gecombineerd met moederkoornalkaloïden (ergotamine, dihydroergotamine).

Er bestaat een geneesmiddeleninteractie tussen clarithromycine (of andere macroliden) en

- alprazolam, triazolam, midazolam( hypnotica, sedativa en anxiolytica)
- carbamazepine, fenytoïne, valproaat ( geneesmiddelen tegen vallende ziekte)
- cilostazole (anti-stollingsmiddel)
- orale anticoagulatia (b.v. warfarine)
- cisapride (geneesmiddel tegen misselijkheid en braken)
- cyclosporine, tacrolimus (geneesmiddel dat het immuunsysteem beïnvloedt)
- disopyramide, kinidine (hartritmeregelaars)
- lovastatine, simvastatine (geneesmiddelen om het gehalte van cholesterol te verminderen)
- methylprednisolone( synthetisch corticotroop hormoon)
- omeprazole ( geneesmiddel voor het gastro-intestinaal stelsel )
- pimozide (antipsychoticum)
- rifabutine (antibioticum)
- sildenafil (middel bij impotentie)
- terfenadine (antihistaminicum)
- theofylline ( middel bij astma)
- vinblastine (antitumorale geneesmiddel)

Het kan nodig zijn om de dosissen van deze geneesmiddelen te verlagen, behalve dan voor de associatie van clarithromycine met cisapride, pimozide of terfenadine. Deze associaties zijn namelijk tegenaangewezen.

Bij volwassen patiënten bestaat er een interactie tussen clarithromycine, in hoge dosissen, en zidovudine. Deze interactie kan grotendeels worden vermeden door beide produkten afwisselend in te nemen. Clarithromycine Abbott Uno 500 mg zal liefst niet met zidovudine worden gecombineerd.

De dosis clarithromycine moet verlaagd worden bij patiënten met een verstoorde nierwerking, en die tegelijkertijd met ritonavir worden behandeld. De dagdosis clarithromycine mag nooit meer dan 1 g bedragen.

Verwittig uw arts als u een van deze geneesmiddelen gebruikt.

Licth uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

### 3. Hoe wordt Clarithromycine Abbott ingenomen?

Volg deze instructies nauwgezet, tenzij uw arts er u andere gegeven heeft. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

**Volwassenen en kinderen boven de 12 jaar: Clarithromycine Abbott 250 mg omhulde tabletten, Clarithromycine Abbott Forte 500 mg omhulde tabletten en Clarithromycine Abbott Uno 500 mg tabletten met gereguleerde afgifte**

De tabletten met een weinig water innemen. Van Clarithromycine Abbott 250 mg en Clarithromycine Abbott Forte 500 mg wordt er gewoonlijk één tablet 's morgens en één tablet 's avonds, tijdens de maaltijden, ingenomen. In het geval van Clarithromycine Abbott Uno 500 mg wordt (worden) het tablet (de tabletten) in één keer ingenomen, liefst tijdens de maaltijden en altijd op hetzelfde ogenblik van de dag. De Clarithromycine Abbott Uno 500 mg tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt.

De behandelingsduur respecteren.

**Kinderen van 6 maanden tot 12 jaar: Clarithromycine Abbott 125 mg/5 ml granulaat voor orale suspensie**

Uw apotheker heeft uw geneesmiddel voor u bereid.

Het verdient aanbeveling om te drinken na elke inname van de suspensie.

De suspensie goed schudden voor het gebruik. Het aantal in te nemen lepels wordt door uw arts bepaald op grond van de ernst van de ziekte. Volgende tabel is gebaseerd op een dosis van 7,5mg/kg, 2 maal per dag.


| Gewicht van het kind   | Maatlepeltje van 5 ml |           |
|------------------------|-----------------------|-----------|
|                        | 's morgens            | 's avonds |
| 8 - 11kg (1 - 2jaar)   | 1/2                   | 1/2       |
| 12 - 19kg (2 - 4jaar)  | 1                     | 1         |
| 20 - 29kg (4 - 8jaar)  | 1 1/2                 | 1 1/2     |
| 30 - 40kg (8 - 12jaar) | 2                     | 2         |

De posologie en de behandelingsduur moeten nauwlettend gevolgd worden.

Gebruiksaanwijzing voor de pediatrische spuit

**Nooit de suspensie opzuigen zonder ze vooraf goed te schudden.**

1. Het flesje openmaken.
2. De stop in de hals van de fles duwen.
3. De doseerspuit in de opening van de stop schuiven.
4. Het flesje ondersteboven houden.
5. De door de dokter voorgescheven hoeveelheid opzuigen . (de spuit bevat een gradatie in functie van het lichaamsgewicht)
6. De spuit loskoppelen van het flesje en de suspensie langzaam in de mond van het kind spuiten.
7. De spuit na gebruik met water schoonspoelen.
8. Het flesje opnieuw met de schroef dop afsluiten, zonder de stop te verwijderen.



### **Clarithromycine Abbott I.V. 500 mg poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie**

De aanbevolen dosis bedraagt 1g per dag, verdeeld over twee gelijke perfusies gedurende 60 minuten. De IV behandeling moet worden voorbehouden voor ernstig zieke patiënten en mag niet langer duren dan 2 à 5 dagen. Ze moet zo snel mogelijk door een orale behandeling worden vervangen.

### **Nierinsufficiëntie**

Bij patiënten met nierinsufficiëntie, bij wie de creatinineklaring minder dan 30ml/min bedraagt, moeten de dosissen clarithromycine met de helft worden verlaagd.

Behandelingsduur:

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Clarithromycine Abbott moet gebruiken. Breek uw behandeling niet voortijdig af. Als u de kuur niet voltooit kunnen de symptomen van de infecties terugkomen.

### **Wat u moet doen wanneer u Clarithromycine Abbott vergeet te gebruiken:**

Het is belangrijk de voorgeschreven behandeling te voltooien zelfs als de symptomen eerder verdwijnen. Als u Clarithromycine Abbott heeft vergeten in te nemen, neem het geneesmiddel zo snel mogelijk in en vervolg uw behandeling voor de periode voorgeschreven door uw arts.

### **Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Clarithromycine Abbott wordt gestopt:**

Na de periode voorgeschreven door uw arts kan de behandeling met Clarithromycine Abbott zonder speciale voorzorgen stopgezet worden.

### **Wat u moet doen als u meer van Clarithromycine Abbott heeft ingenomen dan u zou mogen:**

Inname van grote hoeveelheden clarithromycine kan tot maag- en darmklachten leiden. In geval van overdosering moet de behandeling onmiddellijk worden stopgezet en dienen de nodige ondersteunende maatregelen te worden getroffen.

De bijwerkingen ten gevolge van een overdosering zullen behandeld worden door middel van een maagspoeling en ondersteunende maatregelen. Peritoneale dialyse en hemodialyse zijn niet geschikt voor eliminatie van clarithromycine.

Wanneer u te veel van Clarithromycine Abbott heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

#### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals alle geneesmiddelen kan Clarithromycine Abbott bijwerkingen hebben.

De ongewenste effecten die het vaakst bij de inspuitsbare vorm worden gemeld, zijn: een ontsteking t.h.v. de injectieplaats, verhoogde gevoeligheid van de huid, flebitis (aderontsteking) en pijn t.h.v. de injectieplaats.

De ongewenste effecten die het vaakst bij de orale vormen worden gemeld, zijn vooral maag-darmstoornissen: misselijkheid, verteringsproblemen, buikpijn, braken en diarree. Andere bijwerkingen zijn: hoofdpijn en smaakstoornissen. Net zoals bij de andere antibiotica van deze groep werden gevallen van leverfunctiestoornissen gemeld, met inbegrip van een reductie of volledige stopzetting van de galafvoer, al dan niet gepaard gaand met geelzucht. Hoewel deze stoornissen gewoonlijk omkeerbaar zijn, kunnen ze in zeer uitzonderlijke gevallen tot een uitgesproken afname van de leverfunctie leiden, vooral bij patiënten die andere ernstige ziekten vertonen en/of nog met andere geneesmiddelen worden behandeld.

Na orale toediening van clarithromycine kunnen er allergische reacties optreden, gaande van urticaria en huida rupties tot anafylactische reacties en het syndroom van Stevens-Johnson/toxische epidermale necrolyse.

Er zijn voorbijgaande storingen van het centraal zenuwstelsel vastgesteld, inbegrepen oorsuizingen, angst, slapeloosheid, duizeligheid, nachtmerries, verwardheid, desoriëntatie, hallucinaties, psychose en depersonalisatie. Er kon echter nog geen causaal verband tussen het produkt en deze stoornissen worden aangetoond.

Andere, zelden gerapporteerde bijwerkingen van clarithromycine zijn:

- enkele gevallen van gehoorverlies. Meestal zijn die omkeerbaar na het stopzetten van de behandeling.
- ontsteking van tong en mondholte, evenals een verkleuring van tong en tanden. Deze verkleuring verdwijnt gewoonlijk na het reinigen van de tanden door een tandarts.
- veranderingen in de reukzin, gewoonlijk in samenhang met een veranderde smaakgewaarwording.
- geïsoleerde gevallen van daling van de bloedsuiker, vermindering van het aantal bloedplaatjes en vermindering van de witte bloedcellen.
- zoals bij andere antibiotica van dezelfde familie gevallen van verstoring van het hartritme.
- enkele uitzonderlijke gevallen van pancreatitis en convulsies.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

#### **5. Hoe bewaart u Clarithromycine Abbott?**

Clarithromycine Abbott buiten bereik en zicht van kinderen houden.

**Clarithromycine Abbott Uno** 500 mg tabletten met gereguleerde afgifte: tussen 15°C en 30°C bewaren en beschut tegen licht.

**Clarithromycine Abbott Forte** 500 mg omhulde tabletten: op kamertemperatuur bewaren en beschut tegen licht.

**Clarithromycine Abbott** 250 mg omhulde tabletten: op kamertemperatuur bewaren

**Clarithromycine Abbott** 125 mg/5 ml granulaat voor orale suspensie: op kamertemperatuur (tussen 15°C en 30°C) bewaren en beschut tegen vocht. De bereide suspensie kan bij kamertemperatuur gedurende 14 dagen worden bewaard. De gereconstitueerde suspensie niet in de koelkast bewaren.

**Clarithromycine Abbott I.V.** 500 mg poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie: Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Uit microbiologisch oogpunt, dient deze inspuitsbare vorm onmiddellijk na het openen te worden gebruikt. De moederoplossing van de inspuitsbare vorm kan bij kamertemperatuur gedurende 24 uur en bij een temperatuur van 5°C gedurende 48 uur worden bewaard. De uiteindelijke, verdunde oplossing moet binnen de 6 uur worden gebruikt als ze bij een temperatuur van 25°C wordt bewaard en binnen de 48 uur als ze bij een temperatuur van 5°C wordt bewaard.

**Uiterste gebruiksdatum:**

Gebruik Clarithromycine Abbott niet meer na de vervaldatum die op de verpakking na "EX" staat.

De cijfers na "EX" .../... betekenen: de laatste dag van de maand/jaar.

## **6. Aanvullende informatie**

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.

Afleveringswijze:

Op medisch voorschrift.

**A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2010**

**B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is ...**

**De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:**

Bereiding van de drinkbare suspensie **Clarithromycine Abbott** 125 mg/5 ml:

Fles van 60ml

In twee keren 32ml gedistilleerd water toevoegen.

Goed schudden na elke toevoeging van water.

Zo bekomt men 60ml suspensie.

Fles van 120ml

In twee keren 64ml gedistilleerd water toevoegen.

Goed schudden na elke toevoeging van water.  
Zo bekomt men 120ml suspensie.

De gereconstitueerde suspensie niet in de koelkast bewaren.

**Clarithromycine Abbott I.V. 500 mg poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie:**  
**Bereiding van de oplossing voor infusie:**

- Moederoplossing

Tien ml steriel water voor injecties toevoegen aan het gelyofiliseerde poeder.  
Geen oplossingen gebruiken die bewaarmiddelen of anorganische zouten bevatten. Uit microbiologisch oogpunt, dient deze inspuitsbare vorm onmiddellijk na het openen te worden gebruikt. Als de bereiding heeft plaatsgevonden in een aseptisch gecontroleerd en gevalideerd lokaal, kan de bereide oplossing bewaard worden gedurende 48 uur bij 5°C en 24 uur bij 25° C.

- Verdunning

De moederoplossing wordt verdund met 250 ml van één van de volgende oplossingen :

- 5% glucose in een Ringer-lactaatoplossing
- 5% glucose
- 0,9% natriumchloride
- Ringer-lactaatoplossing
- 5% glucose in 0,3% natriumchloride
- 5% glucose in 0,45% natriumchloride.

Deze oplossing dient binnen de 6 uur te worden gebruikt als ze bij een temperatuur van 25°C wordt bewaard en binnen de 48 uur als ze bij een temperatuur van 5°C wordt bewaard.

**Er mag geen enkel ander product aan de oplossing worden toegevoegd tenzij men van vooraf zeker is dat een gelijkaardige toevoeging geen nefaste gevolgen heeft op de chemische en fysische stabiliteit.**